



POLICLOSTRIGEN® P7



Indicaciones.

Vacuna inactivada para la inmunización de bovinos y ovinos contra Carbón (Mancha), Gangrena Gaseosa, Enterotoxemia, Muerte Súbita y Pasteurelosis.

Composición.

Bacterinas y/o toxoides de *Clostridium chauvoei* (1,5x10⁹ células viables), *Clostridium septicum* (5x10⁹ células viables), *Clostridium perfringens* C (500 DLM o 10 U.I. de toxina Beta), *Clostridium perfringens* D (1000 DLM o 5 U.I. de toxina Epsilon), *Clostridium sordellii* (2x10⁹ células viables), *Pasteurella multocida* Grupo A (500x10⁶ bacterias) y *Mannheimia haemolytica* (250x10⁶ bacterias) en gel de hidróxido de aluminio.

Dosis y vía administración.

Bovinos: 5 mL.

Ovinos: 2 mL.

Vía: subcutánea.

Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Conservación.

Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz.

No congelar.

Presentación.

Frascos de 20 y 50 dosis de 5 mL.